



AVERTISSEMENTS AGRICOLES

REGION MIDI-PYRENEES

ÉDITION GRANDES CULTURES

Ministère de l'Agriculture
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Rue Saint-Jean • BP 19 • 31130 BALMA
Tél. (61) 24.06.51

DLP 20-3-843213.6
PUBLICATION PÉRIODIQUE
Abonnement annuel : 92 F
Sous-régisseur Recettes D.D.A. Hte-Gne
CCP : 8612-11 R Toulouse

BULLETIN N° 2 DU 7 MARS 1984

CE BULLETIN EST LE DERNIER ADRESSE AUX ABONNES N'AYANT PAS
ENCORE RENOUVELE LEUR ABONNEMENT POUR L'ANNEE 1984 (Voir conditions
d'abonnement en fin de bulletin).

COLZA

CHARANCON DE LA TIGE (*Ceuthorrhynchus napi*)

* Situation

La reprise de végétation du colza est amorcée dans l'ensemble des cultures. Le stade de développement va de C1 à C2.

Les premières captures d'adultes de Charançons de la tige ont été notées dans la quasi-totalité des pièges aux environs du 20 février. Elles sont nulles actuellement, en raison des basses températures.

Toutefois, la reprise d'activité du charançon est à prévoir dès le prochain réchauffement.


* Préconisations

La période de sensibilité des Colzas s'étend du stade C2 au stade "hauteur de la tige à 20 cm" ; en conséquence, procéder à la surveillance d'activité de ce ravageur, dès à présent, soit en dénombrant les captures d'adultes en cuvette jaune, soit en procédant au contrôle des pontes visibles à

la face inférieure des pétioles ou dans les jeunes tiges (comptage sur 50 plantes).

C₁ Reprise de la végétation.
Apparition de jeunes feuilles.

C₂ Entre-nœuds visibles. On voit un étranglement vert clair à la base des nouveaux pétioles c'est la tige



C - Montaison

A. GRAAUD - S. P. V.

T.S.V.P. P./L

Le seuil d'alerte est atteint à partir de 10 captures de charançons en 24 heures dans une cuvette.

Le seuil d'intervention est de 1 ponte par plante, en moyenne, après observations de 50 plantes dans une parcelle. Ce seuil n'est pas encore atteint mais il devrait l'être lors du prochain réchauffement.

En cas d'intervention insecticide, utiliser l'une des matières actives suivantes :

- parathion à 300 g de m.a./ha (NOMBREUSES SPECIALITES)
- endosulfan à 400 g de m.a./ha (NOMBREUSES SPECIALITES)
- lindane à 300 g de m.a./ha (NOMBREUSES SPECIALITES)
- méthidathion à 300 g de m.a./ha (ULTRACIDE 20)
- phosalone à 1 200 g de m.a./ha (AZOFENE, ZOLONE)
- cyperméthrine à 25 g de m.a./ha (CYMBUSH, KAFIL SUPER).

Le traitement doit être réalisé aux heures chaudes de la journée.

CEREALES

MALADIES

Malgré la présence fréquente de maladies sur le feuillage (Rouille brune, Septoriose, Oïdium sur blé, Rhynchosporiose et Oïdium sur orge), toute intervention fongicide est encore prématurée.

RAVAGEURS

Des dégâts dus à des larves de Mouches (*Chlorops pumilionis* vraisemblablement) sont actuellement constatés, localement, sur blé et orge dans la HAUTE-GARONNE et le TARN-ET-GARONNE.

Les symptômes se traduisent par le tallage aberrant et le jaunissement des plants attaqués. Les tiges s'épaississent au niveau des larves présentes à l'intérieur.

Toute intervention insecticide est inutile.

ABONNEMENTS

EDITIONS

- Edition régionale "ARBRES FRUITIERS"
- Edition régionale "VIGNE"
- Edition régionale "GRANDES CULTURES"
- Edition "VIGNE FRONTON"
- Edition "VIGNE CAHORS"

TARIFS 1984

- Prix unitaire pour chaque édition 92 F. TVAC
- A partir de 10 abonnements à une même édition .. 83 F. TVAC

Une remise de 10 % est accordée pour toute commande de plusieurs éditions à la même adresse.

Exemples : Abonnement individuel à 2 éditions = 165 F, à 3 éditions = 248 F.

MODE DE PAIEMENT (PAR CHEQUE POSTAL OU BANCAIRE)

- * LIBELLER votre chèque exclusivement à l'ordre du Sous-Régisseur Recettes DDA Hte-Garonne.
- * ENVOYER votre chèque (en précisant bien la ou les éditions choisies) à :

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
(Abonnements)
B.P. n° 19
31130 BALMA